

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA



**PREVALENCIA DE LESIONES ABFRACTIVAS Y SU RELACIÓN
CON LOS NIVELES DE ANSIEDAD**

**TESIS PARA OPTAR POR
EL TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA**

PRESENTADO POR EL:
Bach. David Arturo, MAYTA PEREZ

LIMA – PERÚ
2018

RESUMEN

El propósito de la presente investigación fue determinar la prevalencia de Lesiones Abfractivas y su relación con los niveles de Ansiedad en alumnos de Estomatología del IX ciclo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega del año 2017. El Diseño metodológico fue descriptivo, el tipo de investigación fue Transversal, Observacional y Prospectivo, y el enfoque Cuantitativo. Para poder realizar la ejecución del estudio, se utilizó una Muestra que estuvo conformada por 43 alumnos que están matriculados en la Clínica Estomatológica de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, que fueron seleccionados en forma no aleatoria por conveniencia, que cumplieron con los criterios de selección. En los Resultados se observa que en mayoría Si tuvieron prevalencia de lesiones abfractivas y ausencia de ansiedad en un número de 19 teniendo un porcentaje de 44.2%. En la presente investigación se llegó a la Conclusión que en mayoría hubo prevalencia de lesiones abfractivas y ausencia de ansiedad, pero no hubo relación estadísticamente significativa.

Palabras clave

Abfractivas, Ansiedad, Lesiones, Prevalencia

ABSTRACT

The purpose of the current research was to determine the prevalence of Open Lesions and its relationship with the levels of Anxiety in Stomatology students of the ninth cycle of the university Inca Garcilaso in the vega of 2017. The methodological design was descriptive, the type of research Transversal, Observational and Prospective, and the Quantitative approach. To be able to carry out the study, they were satisfied with 43 students who are enrolled in the Stomatological Clinic of the Inca Garcilaso de la Vega University, who were randomly selected for convenience, who met the selection criteria. In the results it was observed that in majority. Have a percentage of 44.2%. In the present investigation, it was concluded that in the majority there was a prevalence of abrupt lesions and absence of anxiety, but there was no statistically significant relationship.

Keywords

Abfractivas, Anxiety, Injuries, Prevalence.