

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
FACULTAD DE ENFERMERÍA**



**FACTORES ASOCIADOS EN LA APARICIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN
EN EL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL DE EMERGENCIAS GRAU, 2018.**

TESIS

**PRESENTADO POR:
BACH. JUANI QUISPE LAURA**

PARA OPTAR EL GRADO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA

ASESORA: MG. GLEDY GULNARA TORNERO TASAYCO

LIMA, PERÚ

2018

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los factores asociados y la aparición de las úlceras por presión en adulto mayor postrado en el servicio de Medicina del Hospital de Emergencias Grau, Lima- 2018. El método fue descriptivo, diseño correlacional, de tipo cuantitativa. La muestra estuvo conformada por 45 pacientes, se utilizó una ficha de cotejo, la cual obtuvo una confiabilidad fuerte de 0,863 y 0,877. Los resultados arrojaron que el 28.89% presentan un nivel bueno con respecto a la variable factores asociados, el 48.89% presentan un nivel regular y un 22.22% un nivel malo, también se evidencia que el 35.56% presentan úlceras por presión y el 64.44% no presentan. Con respecto a la comprobación de la hipótesis existe una relación directa y positivamente la variable factores asociados y úlceras por presión, según la correlación de Spearman de 0.677, teniendo un resultado moderado con una significancia estadística de $p=0.001$ siendo menor que el 0.01. Por lo tanto, se acepta la hipótesis general y se rechaza la hipótesis nula. Se recomendó a la institución hospitalaria en coordinación con el departamento de enfermería elabore y promueva estrategias de educación continua, orientada a promover la capacitación y/o actualizar al profesional de enfermería para prevenir la aparición de ulceras por presión, tomando en cuenta los resultados de esta investigación, así mismo, fortalecer el programa familiar acompañante, sensibilizar y capacitar al familiar del paciente hospitalizado, sobre los cuidados que requiere durante su estancia hospitalaria, para que su recuperación sea pronta.

Palabras clave: úlcera por presión, adulto mayor, factores asociados, fricción.

Abstract

This research aimed to determine the relationship between the associated factors and the appearance of pressure ulcers in elderly bedridden in the Medina of the Grau emergency Hospital service, Lima- 2018. the method was descriptive, correlational, design of quantitative type. The sample was comprised of 45 patients used a file of matching, which got a strong 0.863 and 0,877 reliability. Results showed that the 28.89% presented a good level with respect to the variable associated factors, the 48.89% presented a regular level and a 22.22% a bad level, there is also evidence that the 35.56% have ulcers by pressure and the 64.44% do not have. And with respect to the verification of the hypothesis a correlation exists directly and positively variable ulcers and associated factors for pressure, according to the correlation of Spearman of 0.677, having a result moderate with a statistical significance of $p=0.001$ being less than 0.01. Therefore, the general hypothesis is accepted, and the null hypothesis is rejected. Recommended that hospital institution, in coordination with the nursing department, develops and promotes continuing education strategies, aimed at promoting training and / or updating the nursing professional to prevent the onset of pressure ulcers, taking into account the results of this research. likewise, strengthen the accompanying family program, sensitize and train the family member of the hospitalized patient, about the care he requires during his hospital stay, so that his recovery is prompt.

Key words: ulcers by pressure, old people, associated factors, friction.