

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA**  
**FACULTAD DE ENFERMERÍA**



**FACTORES SOCIOECONOMICOS Y ABANDONO DEL TRATAMIENTO  
ANTITUBERCULOSO EN EL ESQUEMA PARA TUBERCULOSIS SENSIBLE  
EN PACIENTES DE 18-40 AÑOS, CENTRO MATERNO INFANTIL TABLADA  
DE LURIN 2018**

**TESIS**

**PRESENTADO POR:**

**BACH. CRUZCAYA GUTIERREZ FELIX**

**PARA OPTAR EL TITULO DE LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**ASESOR:**

**Dr. EDGAR LUCAS ALVIZURI GOMEZ**

**LIMA, PERÚ**

**2018**

## Resumen

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores socioeconómicos y el abandono del tratamiento antituberculoso en el esquema para tuberculosis sensible en pacientes 18 – 40 años, en el Centro Materno Infantil Tablada de Lurín 2018, mediante un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional descriptivo, se trabajó con una muestra de 69 pacientes, se utilizó como instrumento el cuestionario para la variable factores socioeconómicos y una ficha de observación para evaluar el abandono al del tratamiento antituberculoso, validado por el estadístico alfa de crombach obteniendo una confiabilidad de 0,842 y 0,876.

Concluyéndose que existe una correlación directa entre la variable factores socioeconómicos y la variable abandono del tratamiento antituberculoso, según la correlación de Spearman de 0.717. Asimismo, al jefe de enfermería de la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de la tuberculosis (ESNPCT) del centro de materno infantil. Se recomienda organizar campañas con sesiones educativas sobre la promoción de la salud acerca de la tuberculosis y la adherencia hacia el tratamiento junto al personal de enfermería licenciados, técnicos, auxiliares, promotores de salud y todo el equipo multisectorial y hacer seguimiento con un plan de visitas domiciliarias hacia los pacientes con tratamiento.

**Palabras clave:** Factor económico, abandono, tratamiento tuberculosis.

## **Abstract**

The objective of the research was to determine the relationship between socioeconomic factors and the abandonment of antituberculous treatment in the scheme for sensitive tuberculosis in patients 18 - 40 years old, at the Tablada de Lurín Maternal and Child Center 2018, using a quantitative approach and a descriptive correlational design, we worked with a sample of 69 patients, used as a questionnaire for the variable socioeconomic factors and an observation sheet to assess the abandonment of antituberculous treatment, validated by the alpha statistics of Cronbach obtaining a reliability of 0.842 and 0.876. Concluding that there is a direct correlation between the variable socioeconomic factors and the variable abandonment of antituberculous treatment, according to the Spearman correlation of 0.717. Likewise, to the head of nursing of the national strategy of prevention and control of tuberculosis (ESNPCT) of the maternal and child center. It is recommended to organize campaigns with educational sessions on health promotion about tuberculosis and adherence to treatment with licensed nurses, technicians, assistants, health promoters and the entire multisectoral team and follow up with a plan of visits domiciliary to patients with treatment.

**Key words:** Economic Factor, abandonment treatment, tuberculosis.